


チャック

開封後はチャックをきちんとしめて保管してください。
ここからハサミでお切りください。



ティカパップハイ

ピタリと貼れて肌にフィット



うちみ
ねんざ
肩こり
腰 痛

第3類医薬品

タテ・ヨコ
伸縮自在

6枚入

Analgesics & Anti-inflammatory Agents

消炎・鎮痛パップ剤

チャック

ここからハサミでお切りください。



ご使用に際してこの説明文を必ずお読みください。

うちみ、ねんざ、肩こり、腰痛に

ティカパップ®ハイ6枚入

ユーカリ油配合の外用消炎・鎮痛薬 第3類医薬品

ティカパップ-ハイの特長

- タテ・ヨコ伸縮自在で手軽に使用できる清涼感のある外用消炎・鎮痛パッピング剤です。
- 保水性・吸水性があり、汗だれもなく、粘着性は強く持続性があります。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

☒ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文(アルミ袋)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文(アルミ袋)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■ 効能・効果

打撲、捻挫、筋肉痛、肩こり、腰痛、関節痛、しもやけ、筋肉疲労、骨折痛



■ 使 用 法

1日1~2回、表面のプラスチックフィルムをはがして、患部に貼付してください。

《使用法に関する注意》

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 患部が汗等でぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。
- (3) 使用法を厳守してください。

■ 成 分・分量 (100g(850cm²)中)

L-メントール0.3g、ハッカ油1.0g、dl-カンフル0.5g、ユーカリ油0.1g
(添加物として、酸化チタン、水酸化Al、メタケイ酸アルミニウムMg、ヒマシ油、ポリアクリル酸Na、ポリアクリル酸、カルメロースNa、無水ケイ酸、D-ソルビトール、グリセリン、ポリソルベート80、酒石酸、エデト酸Naを含有します。)

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密封して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造番号

お客様相談係

お問い合わせ先 ティカ製薬株式会社

電話 076-431-8863

受付時間 9時から17時まで(土・日・祝日を除く)

包 装 6枚入 [7.5cm×14.0cm]

使用期限
(西暦年月)

¥650 + 税



製造販売元

ティカ製薬株式会社

〒930-0982 富山市荒川一丁目3番27号 G

副作用被害救済制度

☎0120-149-931